


Délai début de douleur-ECG 17d qualifiant confirmant le SCA ST+

Choix de reperfusion après contact avec cardiologue USIC Nord (tel : 04-77-82-83-41, fax : 04-77-82-83-64)



Traitement associé

Si Thrombolyse :

- 1) **ASPIRINE** (Aspégic®) : 250 mg IV
- 2) **CLOPIDOGREL** (Plavix®)
 - 300 mg si < 75 ans
 - 75 mg si ≥ 75 ans
- 3) **TECNEPLASE** (Métalyse®) : dose poids.
Envisager ½ dose si ≥ 75 ans.
- 4) **ENOXAPARINE** (Lovenox®)
 - si < 75 ans : 30 mg bolus IV + 1 mg/kg sous cutané à 15 min.
 - si ≥ 75 ans : 0,75 mg/kg sous cutané sans bolus

Si Angioplastie Primaire :

- 1) **ASPIRINE** (Aspégic®) 250 mg IV
- 2) **TICAGRELOR** (Brilique®) 180 mg (2cp)
ou
PRASUGREL (Efient®) 60 mg (6 cp)
CI si >75 ans ou <60 kg ou ATCD d'AVC ou d'AIT ou à défaut
CLOPIDOGREL (Plavix®) 600 mg (4x150mg)
- 3) **ENOXAPARINE** (Lovenox®) :
0,5 mg/kg bolus IV + 1 mg/kg SC
HNF uniquement si insuffisance rénale connue : 70UI/kg IV (max 5000 UI)

Oxygénothérapie que si SpO₂ < 90%
Antalgie : morphiniques si EN ≥ 6
Anxiolyse par benzodiazépines si nécessaire
VVP sur bras G, EMLA sur ponction radiale Dte