

## EVALUER LA SITUATION SUR PLACE


**La patiente est-elle en travail ?** Le travail se définit par des contractions utérines prolongées, douloureuses et régulières et des modifications du col utérin

### 1) Paramètres maternels généraux : PA, FC, FR, SpO2, T°C

### 2) Interrogatoire général ET situation obstétricale :

- Parité, terme, déroulement de la grossesse (césarienne programmée, placenta prævia, ...), maternité de suivie, présentation (récupérer les CR échographiques), ATCD maternels
- Contractions (heure de début, rythme, durée)
- Etat de la poche des eaux (rompue ou non, liquide méconial ou non)
- **1er TV** si pas de CI (placenta prævia) : dilatation, présentation, engagement (signe de Demelin), absence de procidence du cordon

#### Signe de Demelin



Présentation non engagée et engagée

« On introduit, dans le vagin, l'index dirigé perpendiculairement à la face antérieure de la symphyse pubienne et au ras de son bord inférieur. Si le doigt bute contre la présentation, c'est qu'il y a engagement.

### 3) Réalisation ou non de l'accouchement sur place

- score de MALINAS B et délais d'acheminement vers une maternité
- dynamique de l'accouchement : **2<sup>ième</sup> TV** à 10 minutes du premier
- envie de pousser ? accouchement antérieur rapide ?

De.....	primipare	deuxième pare	multipare
5 cm ... à DC	4 h	3 h	1h30
7 cm ... à DC	2 h	1 h	30 min
9 cm ... à DC	1 h	30 min	quelques min

Délai < 1 heure  
Accouchement sur place

**ATTENTION**

Prendre en considération :

- Le délai d'arrivée à la maternité
- L'envie de pousser
- La rapidité du/des accouchements précédents

Délai > 1 heure  
Transport en DLG  
+ oxygène si SFA

Score de Malinas B

PROCOLES THERAPEUTIQUES

# MENACE D'ACCOUCHEMENT EXTRAHOSPITALIER

VERSION : V1.0  
Page 2

ECRITURE :  
P. CAVALLI /  
C. CHAULEUR

DATE : 03/2018

**SI TRANSPORT SANS ACCOUCHEMENT:**

- prévenir régulateur et maternité de suivi si à terme, si <35 SA ou malformation fœtal de vers maternité de niveau 2 ou 3
- décubitus latéral gauche
- oxygène et/ou antalgie si besoin (paracétamol, Kalinox®)

CHU Saint-Etienne	Site Hopital Nord	Niveau 3	04 77 82 80 43
CH Roanne	Roanne	Niveau 2b	04 77 44 32 63
CH d'Ardèche Nord	Site d'Annonay	Niveau 2a	04 75 67 35 42
Hôpital privé de la Loire	Saint-Etienne	Niveau 2a	04 77 42 28 22
CH du Forez	Site de Montbrison	Niveau 1	04 77 96 74 16
CH Le Corbusier	Firminy	Niveau 1	04 77 40 73 25
CH Pays de Gier	Site de Saint-Chamond	Niveau 1	04 77 31 19 45

**INDICATION D'APPEL SMUR PEDIATRIQUE D'EMBLEE:**

- siège
- prématurité (< 34-36 SA et/ou poids < 2kg)
- grossesse gémellaire
- liquide méconial et/ou hyperthermie maternelle
- Dilatation complète et procidence du cordon