

Accouchement hors maternité
Situations particulières

Accouchement par le siège


- ON NE TOUCHE PAS L'ENFANT AVANT LA SORTIE DE LA POINTE DES OMOPLATES**
- Prendre obligatoirement et le plus tôt possible contact avec une équipe obstétricale**
- Rassurer et prévenir la parturiente de l'importance de sa coopération
- Attendre que le siège apparaisse** à la vulve pour faire pousser → uniquement pendant les contractions (2 à 3 efforts expulsifs par contraction)
- Indication large d'épisiotomie avant l'expulsion**
- Réceptionner l'enfant en le soutenant au niveau du siège **sans jamais tirer**

Grossesse gémellaire

- Situation à haut risque** (manœuvres et risque d'anoxie pour le 2^e jumeau, hémorragie du post-partum)
- Prendre obligatoirement contact avec une équipe obstétricale**

Procidence du cordon

- URGENCE VITALE / INCOMPATIBLE AVEC UN ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE**
- Repousser la présentation en permanence pour réduire la pression de la tête sur le cordon jusqu'à l'extraction de l'enfant par césarienne** (doigts en intravaginal)
- O2 – Spray nitré si trop de contractions (1 bouffée maximum)
- Transport immédiat et rapide
- Position de Trendelenburg en décubitus latéral
- Prévenir la structure qui va recevoir la patiente : bloc opératoire obstétrical et réanimation du nouveau-né**



Notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....