

Régulation d'un patient suspect d'arrêt cardiaque : protocole NO-NO6GO et conseils de T-RCP adulte et enfant

RECONNAISSANCE = Protocole NO-NO-GO



Quels éléments rechercher?

Quelle formulation?

Quelle décision?

Localisation?

1 question = 1 réponse
 Quelle ville? Quelle commune?
 Quelle rue?
 Quel N°?
 Quel bâtiment? Quel étage?

Quel est le problème?

« Que se passe t il? »
 « Qu'est-ce qui se passe? »
 PHRASE AU PRESENT

Conscience?



« Est-ce qu'il réagit? »
 « Est-ce qu'il vous répond? »



=> envoi VSAV

« Je vous envoie les secours / les secours sont en route, en chemin »

Respiration?



« Est-ce qu'il respire? »



=> envoi SMUR + déclenchement application de citoyen sauveteur

Si oui « est-ce qu'il respire normalement? »

+ moyen SSSM (VLI et VLM) et/ou MCS

Conseil T-RC[®]



« Nous allons faire les gestes de 1^{ers} secours et je vais vous aider / guider »

« On va faire ensemble les 1^{ers} gestes »

Informations à recueillir pour pronostic durant RCP :

- Age?
- Eroulement devant témoin?
- Co-morbidités?

« Quel âge a-t-il/elle? »
 « L'avez-vous entendu / vu faire son malaise? »
 « A-t-il/elle des maladies? »
 « Prend-t-il/elle des médicaments? »

Objectif T-RCP < 60 sec (90sec max)

CONSEIL T-RCP ADULTE

<ol style="list-style-type: none"> 1, Mettez le haut-parleur. 2. Mettez la personne sur le dos par terre. 3. Mettez-vous à genoux, sur le côté, le plus près de sa poitrine 4. Placer la main à plat au centre de la poitrine, entre les deux seins, les bras tendus, la deuxième main au-dessus de la première 5. Maintenant, appuyez/comprimez/enfoncez le plus fort possible la poitrine puis relâchez, appuyez-relâchez, appuyez-relâchez <p>Puis continuez à ce rythme : et 1, et 2, et 3...</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. On continue ensemble jusqu'à l'arrivée des secours, je reste avec vous 7. Prévenir que des citoyens sauveteurs vont arriver si une application a été déclenchée 8. Continuez jusqu'à l'arrivée des secours sur place. 9. Vérifiez régulièrement que la RCP est bien en cours et les encourager 	<p>(si sauveteur seul : ne pas insister pour déplacer la victime sur une surface dure)</p> <p>Mettre en route métronome en fond sonore à 100/min (applications)</p> <p>Si plusieurs personnes : penser à récupérer un DEA et lancer une visio</p>
---	---

CONSEIL T-RCP ENFANT

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez le haut-parleur 2. Enfant > 1an : Mettez l'enfant sur le dos par terre 3. Si vous voyez quelque chose dans sa bouche enlevez-le 4. Soufflez dans sa bouche en bouchant son nez et en regardant sa poitrine se soulever 5. Recommencez 4 fois 6. Enfant > 1an : Placer la main à plat au centre de la poitrine, entre les deux seins, les bras tendus, la deuxième main au-dessus de la première 7. Maintenant, appuyez/comprimez/enfoncez la poitrine puis relâchez, appuyer-relâchez 8. Puis continuez à ce rythme : et 1, et 2, et 3... 9. Au bout de 30 compressions soufflez de nouveau 2 fois dans sa bouche 10. Recommencez à comprimer 3 fois et soufflez 2 fois dans la bouche 11. Prévenir que des citoyens sauveteurs vont arriver si une application a été déclenchée 12. Continuez jusqu'à l'arrivée des secours sur place. 13. Si plusieurs sauveteurs : pensez à récupérer le DEA et lancer une visio 	<p>Enfant < 1an : Mettez l'enfant allongé sur une table</p> <p>Enfant < 1an : Prenez l'enfant entre vos mains, en plaçant vos deux pouces au centre de sa poitrine, les autres doigts passent sous les bras de l'enfant. Appuyez avec vos pouces</p>
---	--