

AVC

TENECTEPLASE - METALYSE®

Kit flacon poudre 10 000 UI + seringue
préremplie 10 mL
1000 UI = 5 mg

Thrombolytique



PLUSIEURS INDICATIONS => UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- AVC avec indication de thrombolyse

CONTRE-INDICATIONS :

- Cf fiche CI à la fibrinolyse

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation, monitoring complet

VVP de gros calibre

Surveillance neuro

Noter l'heure de l'injection



PREPARATION :

Suivre le schéma de préparation indiqué sur la boîte : reconstituer en ajoutant le volume total de la seringue pré-remplie à la poudre de flacon à l'aide de l'adaptateur. Bien visser la seringue d'EPPI sur le dispositif prévu « petit clic »

(Si seringue stérilisée par erreur, possibilité de diluer avec 10 mL d'EPPI (jamais de glucose) en IV, soit 1 000 UI/1 mL

POSOLOGIE : 50 UI/kg (soit 0,25mg/kg) en IVDL sur 5 à 10 sec

Dose max : 25 mg soit 5000 UI



Attention demi dose par rapport au SCA : posologie en fonction du tableau ci-dessous et non en fonction du poids noté sur la seringue

POUR INJECTER LA BONNE DOSE, UTILISER LA **GRADUATION DE LA SERINGUE en mL**
ET NON LE POIDS INDIQUE SUR LA SERINGUE

POIDS (kg) du patient	VOLUME RECONSTITUÉ (mL)	METALYSE (UI)
< 60	3	3 000
60 ≥ P < 70	3,5	3 500
70 ≥ P < 80	4	4 000
80 ≥ P < 90	4,5	4 500
P ≥ 90	5	5 000

EFFETS SECONDAIRES :

- Epistaxis, hémorragie gastro-intestinale, ecchymoses, hémorragie au point de ponction, hémorragie génito-urinaire
- Hypotension, troubles du rythme, angor en post IDM
- Risque majoré d'angio-oedème

Référence :

